



ARCA-Sud



Tabac et public précaire

Éléments bibliographiques

Février 2022

Sommaire

Sites internet - Vidéos	1
Données d'observation.....	2
Interventions pour l'arrêt du tabac et précarité.....	3
Focus sur le projet TAPREOSI	6

Sites internet - Vidéos

Campagne d'incitation à l'arrêt du tabac visant en particulier les fumeurs les plus fragiles sur le plan socio-économique

Santé publique France Du 14 février au 13 mars 2022, Santé publique France valorise la diversité des solutions d'arrêt à travers des témoignages réels, afin de montrer qu'il n'est pas si difficile de demander de l'aide auprès d'un pharmacien, d'un médecin, d'un professionnel de Tabac info service au 39 89, etc. et d'être accompagné gratuitement dans sa démarche.

[En savoir plus](#) ; [Voir les vidéos](#)

Tabac info service

[Consultez le site internet](#)

CNCT – Comité National contre le Tabagisme

[Consultez le site internet](#)

DNF – Demain sera non fumeur

[Consultez le site internet](#)

Génération Sans Tabac

[Consultez le site internet](#)

Fédération Addiction

[Consultez le site internet](#)

Addict Aide

[Consultez le site internet](#)

OFDT

[Consultez le site internet](#)

Données d'observation

A. PASQUEREAU, R. ANDLER, R. GUIGNARD

Consommation de tabac parmi les adultes en 2020 : résultats du Baromètre de Santé publique France

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n°8, 26 mai 2021

En 2020, plus de trois adultes de 18-75 ans sur dix déclaraient fumer (31,8%) et un quart déclaraient fumer quotidiennement (25,5%). Pour l'ensemble de la période couverte en 2020, la prévalence du tabagisme et du tabagisme quotidien ne varie pas significativement par rapport à 2019. Cependant, entre 2019 et 2020, la prévalence du tabagisme quotidien a augmenté de 29,8% à 33,3% parmi le tiers de la population dont les revenus étaient les moins élevés. Cette augmentation est essentiellement due à une hausse entre 2019 et début 2020, avant le premier confinement, une stabilisation étant notée en post-confinement. Les inégalités sociales restent ainsi très marquées en 2020, avec 15 points d'écart entre les plus bas et les plus hauts revenus.

[Lire l'article](#)

G. AIRAGNES, C. LEMOGNE, P. MENETON et al.

Alcohol, tobacco and cannabis use are associated with job loss at follow-up: Findings from the CONSTANCES cohort

PLOS ONE, Vol.14, n°9, September 2019

Substance use is more prevalent among unemployed subjects compared to employed ones. However, quantifying the risk subsequent of job loss at short-term

ARCA-Sud – Association Régionale de Coordination en Addictologie – Région Sud

(ARCA-Sud est issue de la fusion de 3 dispositifs de coordination en addictologie : Addiction 06, DICAdd13, Resad84)



Comité Régional d'Éducation pour la Santé – Provence Alpes côte d'Azur www.cres-paca.org

according to substance use remains underexplored as well as examining if this association persist across various sociodemographic and occupational positions previously linked to job loss. We examined this issue prospectively for alcohol, tobacco, cannabis use and their combination, among a large population-based sample of men and women, while taking into account age, gender, overall health status and depressive symptoms.

[Lire l'article](#)

Interventions pour l'arrêt du tabac et précarité

J. PERRIOT, P. LEMAIRE, F. MARCHANDISE et al.

Prise en charge du sevrage tabagique de fumeurs allocataires du RSA dans un centre d'aide à l'arrêt du tabac

Revue des maladies respiratoires, Vol.13, n°1 janvier 2021, p.154

[Lire l'article](#)

S. SAETTA; J. KIVITS; K. FROHLICH; L. MINARY

Stigmatisation et santé publique : le côté obscur des interventions anti-tabac

Santé Publique, Vol.32, n°5-6, septembre-octobre-novembre-décembre 2020, pp. 473-478

Les stratégies de lutte contre le tabagisme, estimées légitimes et efficaces, font rarement l'objet, en France, d'une analyse critique concernant leurs effets potentiellement délétères, notamment à l'encontre des personnes qui continuent de fumer. Cet article introduit ce débat, en se concentrant sur les effets potentiellement stigmatisants et « auto-stigmatisants » (self-stigma) des politiques anti-tabac. Dans la mesure où le tabagisme se concentre aujourd'hui en France dans les catégories les moins favorisées du point de vue socio-économique, ces dernières se trouvent ainsi davantage exposées à la stigmatisation..

Article disponible auprès d'ARCA-Sud

R. GUIGNARD, V. NGUYEN THANH, O. DELMER et al.

Aide à l'arrêt du tabac et publics défavorisés : état des connaissances

La Santé en action, n°444, Juin 2018

Aider les fumeurs des catégories défavorisées requiert de leur proposer des services (accompagnement et aide au sevrage) au plus près de leur lieu de vie. À cet égard, les pays peuvent s'inspirer des services intensifs d'aide au sevrage tabagique au Royaume-Uni. Les interventions sont d'autant plus efficaces qu'elles ont été co-construites et adaptées à leurs besoins spécifiques, en particulier pour ce qui concerne le remboursement des soins.

[Télécharger l'article](#)

R. GUIGNARD, NGUYEN-THANH V, DELMER O. et al.

Interventions pour l'arrêt du tabac chez les fumeurs de faible niveau socio-économique : synthèse de la littérature

Santé Publique 2018/1 Vol. 30, pp. 45 à 60

Deux revues systématiques publiées en 2014 montrent que la plupart des interventions recommandées pour l'arrêt du tabac, notamment individuelles, ont tendance à accroître les inégalités sociales de santé. Afin de mettre à disposition des décideurs et des acteurs de terrain un ensemble de données probantes concernant les modalités d'interventions pour inciter et aider les fumeurs socio-économiquement défavorisés à arrêter de fumer, une analyse de la littérature la plus récente a été réalisée.

[Télécharger l'article](#)

P.BERGERON, M.TREMBLAY

Interventions et mesures pour favoriser le renoncement au tabac chez les populations défavorisées sur le plan socioéconomique. Synthèse des connaissances

INSPQ, 2018-06, 148 p.

La présente synthèse a été entreprise pour mieux comprendre quelles mesures favoriseraient une baisse de la prévalence du tabagisme chez les populations défavorisées à la hauteur de ce qu'on a observé dans les groupes plus favorisés.

[Téléchargez le document](#)

A. DESCHENAU, A. L. LE FAOU, D. TOUZEAU

Précarité et sevrage tabagique : réflexions à partir des données de la consultation de tabacologie de l'hôpital européen Georges-Pompidou (AP-HP), Paris

Revue des Maladies Respiratoires, Vol.34, n°1, Janvier 2017, pp.44-52

L'objectif de cette étude était de comparer les caractéristiques et le sevrage des fumeurs en situation de précarité sociale reçus une première fois en 2013 en tabacologie à l'hôpital européen Georges-Pompidou par rapport aux autres fumeurs. Résultats : Parmi les 250 nouveaux consultants, les fumeurs précaires (36,8 %) se distinguaient par un tabagisme plus sévère et des troubles psychiatriques plus fréquents. Ils ont bénéficié le plus souvent d'un TSN associant patchs et formes orales et ont assisté à un plus grand nombre de consultations (4,7 contre 3,4). S'ils étaient moins souvent abstinents (22,2 versus 41,3 %), ils parvenaient à une réduction significative de leur consommation.

Article disponible auprès d'ARCA-Sud

R.GUIGNARD

Une revue de la littérature sur les interventions efficaces d'aide à l'arrêt du tabac auprès des fumeurs ayant un faible niveau socio-économique

Rencontres santé publique France, 2016

[Téléchargez le document](#)

M.PREVOST, V.HUBENS

Tabagisme, précarité, estime de soi,

La santé conjugée, n°74, 2016-03, 9 p.

Depuis plusieurs années, certaines maisons médicales belges développent des projets axés sur le tabagisme, avec une attention particulière pour les personnes les plus précarisées parmi leur patientèle. Au centre de ces projets, une réflexion sur la manière dont les soignants considèrent ces patients et soutiennent leur estime de soi, facteur clé dans le domaine de la santé : une approche qui va bien au-delà du tabagisme proprement dit.

[Lire l'article](#)

F MERSON ; J.PERRIOT, M.UNDERNER

Le sevrage tabagique des fumeurs en situation de précarité : état des lieux et propositions d'optimisation

Revue Médicale de Liège, 2015, 13 p.

[Lire l'article](#)

A.-L LE FAOU., M.BAHA

Sevrage tabagique et personnes en situation de précarité : l'intérêt d'une prise en charge spécifique

La santé en action, n°427, 2014, pp. 6-8

[Téléchargez la revue](#)

B.SALLA, J.BLASER, I.JACOT SADOWSKI

Aide à l'arrêt du tabac pour les populations vulnérables Recherche-action auprès du Point d'Eau de Lausanne

Cipret-Vaud, 2014, 16 p.

Le Centre d'information pour la prévention du tabagisme (CIPRET-Vaud) a pour mandat de prévenir le tabagisme auprès de l'ensemble de la population vaudoise, y compris auprès des personnes appartenant à des groupes vulnérables. Ce rapport rend compte d'un projet pilote d'aide à l'arrêt auprès de personnes vulnérables. Il aborde le contexte scientifique de la recherche action, le déploiement et le déroulement du projet et se conclut par quelques recommandations.

[Téléchargez le rapport](#)

Tabagisme : accompagner les personnes en situation de précarité. Mode d'emploi

ANPAA Bretagne, IREPS Bretagne, ARS Bretagne, 2019-06, 4p.

Depuis 2017, le nombre de fumeurs quotidiens diminue. Le tabagisme reste néanmoins un marqueur social : les personnes en situation de précarité et d'exclusion sont aujourd'hui les plus consommatrices de tabac.

[Téléchargez le document](#)

L. GAMACHE, P. BERGERON

Les interventions et mesures de prévention pour réduire les inégalités en matière de tabagisme chez les jeunes. Synthèse des connaissances

INSPQ, 2019, 115 p.

Cette synthèse de connaissances a été réalisée afin d'identifier les mesures et les interventions de prévention susceptibles de pouvoir réduire les inégalités en matière d'initiation au tabac chez les jeunes. L'impact des interventions a été évalué en termes d'équité, c'est-à-dire en comparant leurs effets entre les groupes socioéconomiques.

[Téléchargez le rapport](#)

P. ARWIDSON, R. GUIGNARD, V. NGUYEN THANH

Conception et évaluation d'une intervention d'aide à l'arrêt du tabac visant à la réduction des inégalités de santé. L'exemple du site Internet StopAdvisor en Grande-Bretagne

Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire, n°16-17, 7 juin 2016

La réduction du tabagisme dans les populations socialement défavorisées est une composante importante de la réduction des inégalités sociales de santé. Pour cela, outre la prévention de l'initiation tabagique au sein de ces populations, il importe de concevoir des interventions d'aide à l'arrêt du tabac efficaces et adaptées à cet objectif. Le projet StopAdvisor, mené par une équipe britannique, est un dispositif d'aide à l'arrêt du tabac par Internet. Cet article propose la synthèse d'un ensemble de travaux consacrés à la conception et l'évaluation de StopAdvisor.

[Lire l'article](#)

Focus sur le projet TAPREOSI

Projet TAPREOSI (Tabac et précarité, évaluation opérationnelle d'une stratégie d'intervention)

Fédération Addiction, Fédération des acteurs de la solidarité

Le kit TAPREOSI présente les étapes clés pour mettre en place un projet de prévention et de réduction du tabagisme au sein des établissements d'accueil et d'hébergement. Pour chaque étape, des outils et des ressources concrètes sont proposées.

Le kit est ainsi constitué :

- d'une vidéo qui présente les principales étapes de la méthodologie d'intervention
- d'une affiche infographique qui synthétise les étapes et les actions à mettre en œuvre ;
- d'une synthèse des ressources ;
- et d'un livret qui détaille la méthodologie et recense les outils pour la mettre en œuvre ;

[Téléchargez l'affiche, la synthèse des ressources et le kit complet](#)